

«МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО (ХИРУРГИЯ) – РИСКИ» Приложение №2 ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ – ОПЕРАЦИЯ ПО ГИНЕКОМАСТИИ

Приложение №2 «МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО (ХИРУРГИЯ) – РИСКИ»: утверждено ООО «ARZ EST» 02.05.2019 постановлением №01/5.

Это неотъемлемая часть Контракта, подписанного между ООО «ARZ EST» и Клиентом/Пациентом.

ИНСТРУКЦИИ

Этот документ информированного согласия подготовлен, чтобы ознакомить вас с операцией по гинекомастии (уменьшение мужской груди), её рисками и альтернативными методами лечения. Важно внимательно и полностью ознакомиться с этой информацией.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Операция по гинекомастии направлена на удаление избыточного жира, железистой ткани и/или кожи с чрезмерно развитой или увеличенной мужской груди.

В тяжелых случаях вес избыточной ткани может вызвать опущение груди и растяжение ареолы (темной области вокруг соска). В таких случаях положение и размер ареолы могут быть скорректированы хирургически, а избыточная кожа уменьшена, что приведет к дополнительным рубцам.

Гинекомастия может быть вызвана гормональными изменениями, наследственностью, заболеваниями или использованием определенных лекарств и проявляться с одной стороны (одна грудь) или с обеих сторон.

Существует несколько техник, используемых пластическими хирургами для лечения гинекомастии. Под ареолой часто есть более плотная ткань, требующая удаления и биопсии, а также дополнительная жировая ткань вокруг груди, которую часто лучше удалять с помощью липосакции. Мужской рак груди встречается гораздо реже, чем у женщин, но удаленная плотная ткань может потребовать патологического исследования. Операция по гинекомастии может сочетаться с другими процедурами контурирования тела, включая липосакцию, или выполняться одновременно с другими плановыми операциями.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Альтернативные методы включают отказ от операции или ношение корректирующего белья для маскировки большой груди. У некоторых пациентов липосакция использовалась для уменьшения размера груди. Альтернативные методы также связаны с рисками и возможными осложнениями.

РИСКИ ОПЕРАЦИИ ПО ГИНЕКОМАСТИИ

Любая хирургическая процедура связана с определенными рисками. Важно понимать эти риски и возможные осложнения, а также ограничения процедуры. Решение пациента о проведении операции основывается на сравнении риска и потенциальной пользы.

Хотя большинство пациентов не сталкиваются с осложнениями, следует обсудить все риски с пластическим хирургом.

Общие хирургические риски:

- **Проблемы заживления:** некоторые заболевания, добавки и лекарства могут замедлить заживление. Пациенты с резким снижением веса могут иметь замедленное заживление, расхождение швов, инфекции и изменения тканей, требующие дополнительного лечения или госпитализации. Диабетики и пациенты на стероидной терапии также могут иметь задержку заживления. Курение замедляет процесс восстановления и увеличивает вероятность повторной операции.
- **Кровотечения:** возможны кровотечения во время или после операции. Может потребоваться дренирование или переливание крови. Несоблюдение послеоперационных инструкций повышает риск. Не принимайте аспирин и противовоспалительные препараты как минимум за 10 дней до и после операции.
- **Инфекции:** могут возникнуть в раннем или позднем периоде после операции. При инфекции может потребоваться антибиотикотерапия или повторная операция.
- **Рубцы:** любая операция оставляет рубцы, которые могут быть заметными, асимметричными или требовать хирургической коррекции.
- **Плотность тканей:** чрезмерная плотность тканей возможна из-за внутреннего рубцевания и может потребовать дополнительного вмешательства.
- **Изменения чувствительности сосков и кожи:** возможна временная или постоянная потеря чувствительности, которая может повлиять на сексуальную реакцию.
- **Неровности контура кожи:** могут возникнуть «собачьи ушки» или другие деформации, которые со временем могут улучшиться или потребовать коррекции.
- **Изменение цвета кожи и отёки:** возможны временные или, в редких случаях, постоянные изменения.
- **Разделение ран и швы:** может потребоваться удаление швов или повторная операция.
- **Повреждение глубоких структур:** возможны травмы нервов, сосудов, мышц и лёгких (пневмоторакс).
- **Некроз жира и серома:** возможна гибель жировой ткани или накопление жидкости, требующее вмешательства.
- **Анестезия:** как местная, так и общая анестезия связаны с риском осложнений, травм и, в редких случаях, смерти.
- **Боль, сердечно-легочные осложнения, аллергические реакции, асимметрия, лимфоотёки, неудовлетворительные результаты:** все эти риски описаны выше и могут потребовать дополнительной хирургии или лечения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Курение и воздействие никотина увеличивают риск осложнений.
- Препараты и добавки могут влиять на свертываемость крови и взаимодействовать с хирургическим лечением.
- Воздействие солнца может ухудшить заживление и увеличить видимость рубцов.
- Планирование поездок и активности важно обсудить с хирургом.
- Болезни груди могут развиваться независимо от операции.
- Психическое здоровье и ожидания должны быть реалистичными.

НЕОБХОДИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В некоторых случаях может потребоваться повторная операция для коррекции груди.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПАЦИЕНТА

Необходимо строго следовать указаниям хирурга, ограничивать физическую активность и участвовать в послеоперационном наблюдении для успешного восстановления.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Документ информированного согласия предназначен для ознакомления с рисками и альтернативами операции. Он не охватывает все возможные методы лечения и риски. Хирург может предоставить дополнительную информацию, основанную на конкретном случае пациента и текущем состоянии медицины.