

«РИСКИ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ХИРУРГИИ)»

Приложение №2

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ – ПРОЦЕДУРЫ ПЕРЕСАДКИ ЖИРА ЖИРОВЫЕ ТРАНСПЛАНТАТЫ И ИНЪЕКЦИИ

«РИСКИ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ХИРУРГИИ)» Приложение №2: утверждено «ARZ EST» 02.05.2019 приказом №01/5

Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора, заключённого между ООО «ARZ EST» и Клиентом/Пациентом.

ИНСТРУКЦИИ

Данный документ представляет собой форму информированного согласия, подготовленную для того, чтобы помочь вашему пластическому хирургу проинформировать вас о процедуре пересадки жира (жировые трансплантаты или инъекции жира), её рисках и альтернативных методах лечения.

Важно внимательно и полностью прочитать данную информацию. Пожалуйста, поставьте инициалы на каждой странице, подтверждая, что вы её прочитали, и подпишите согласие на операцию, предложенную вашим пластическим хирургом и согласованную с вами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Собственный жир пациента может использоваться для улучшения внешнего вида тела путём его перемещения из области, где он менее необходим (обычно бёдра или живот), в область, утратившую объём тканей вследствие старения, травмы, операции, врождённых дефектов или других причин.

Обычно пересадка жира приводит к увеличению объёма обрабатываемой зоны. Перед процедурой области, из которых будет удаляться жир, могут быть обработаны специальным раствором для уменьшения синяков и дискомфорта. Жир может удаляться с помощью узкого хирургического инструмента (канюли) через небольшой разрез либо иссекаться непосредственно через более крупный разрез.

В некоторых случаях жир подготавливается специальным образом перед повторным введением в организм. Такая подготовка может включать промывание, фильтрацию и центрифугирование (вращение) жира. Затем жир вводится в нужную область с помощью меньшей канюли или иглы либо помещается непосредственно через разрез.

Поскольку часть пересаженного жира со временем может уменьшаться в объёме, хирург может ввести большее количество, чем необходимо, чтобы достичь желаемого конечного результата. В течение нескольких недель объём пересаженного жира уменьшается. Иногда для поддержания желаемого результата может потребоваться дополнительная пересадка жира.

Процедуры пересадки жира могут проводиться под местной анестезией, седацией или общей анестезией в зависимости от объёма вмешательства.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Альтернативные нехирургические и хирургические методы включают инъекции синтетических веществ для увеличения объёма тканей (например, гиалуроновая кислота, полимолочная кислота и др.), использование искусственных имплантатов или другие хирургические процедуры по переносу тканей (лоскутные операции).

С альтернативными методами лечения также связаны риски и возможные осложнения.

РИСКИ ПРОЦЕДУР ПЕРЕСАДКИ ЖИРА

Любая процедура связана с определённым риском, и важно понимать возможные риски. Решение о проведении процедуры основывается на сопоставлении риска и потенциальной пользы. Хотя большинство пациентов не сталкиваются с осложнениями, вам следует обсудить каждый из них с пластическим хирургом, чтобы полностью понимать возможные риски, осложнения и последствия.

Специфические риски пересадки жира

Изменение внешнего вида: Обычно пересаженный жир частично уменьшается в объёме, после чего стабилизируется. Возможно, потребуются повторная процедура для поддержания желаемого объёма и внешнего вида. В редких случаях при значительном наборе веса пересаженный жир может увеличиться в объёме и привести к нежелательному результату. Важно понимать, что может потребоваться более одной процедуры, и обсудить с хирургом связанные с этим расходы.

Уплотнения и неровности: В большинстве случаев пересаженный жир ощущается естественно, однако возможно его частичное или полное уплотнение. Если часть жира не приживётся, может развиваться жировой некроз (гибель жировой ткани), вызывающий уплотнение, дискомфорт или боль. В области пересадки могут образовываться кисты. Для коррекции может потребоваться операция.

Асимметрия: Симметричный внешний вид тела не всегда достигается. Такие факторы, как тонус кожи, жировые отложения, костные выступы и мышечный тонус, могут способствовать естественной асимметрии.

Долгосрочные изменения: Изменения формы или внешнего вида области, откуда был удалён или куда был введён жир, могут происходить вследствие старения, изменения веса и других факторов, не связанных с процедурой.

Потеря тканей: В редких случаях пересаженный жир может привести к повреждению кожи и потере кожных и подлежащих тканей, что может вызвать рубцы, деформацию и потребовать хирургического лечения.

Пересадка жира в грудь: Метод применяется для коррекции после реконструкции груди после лечения рака, исправления деформаций и увеличения груди. Долгосрочные последствия изучены ограниченно. Возможны трудности в диагностике рака груди, поскольку пересаженный жир может уплотняться и образовывать узелки, требующие проведения маммографии, УЗИ или МРТ. Может потребоваться биопсия. Нет оснований считать, что пересадка жира вызывает рак груди.

Серьёзные осложнения: Крайне редко возможны тяжёлые осложнения, включая жировую эмболию (попадание жира в кровоток), инсульт, менингит, тяжёлую инфекцию, слепоту, потерю зрения или смерть.

Тромбы: Возможны тромбозы вен рук, ног или таза, особенно при хирургическом вмешательстве. Тромбы могут привести к серьёзным осложнениям, включая эмболию лёгочной артерии.

Лёгочные осложнения: Возможны осложнения со стороны лёгких, включая эмболию и частичный коллапс лёгкого после общей анестезии. Может потребоваться госпитализация. В редких случаях жировая эмболия может быть смертельной.

ОБЩИЕ РИСКИ ХИРУРГИИ

Проблемы заживления: Некоторые заболевания, препараты и добавки могут замедлять заживление. Курение значительно увеличивает риск осложнений. Возможны расхождение швов, инфекция, изменение формы, необходимость повторной операции.

Кровотечение: Хотя редко, возможно кровотечение во время или после операции. Может потребоваться экстренное лечение или переливание крови. Приём аспирина и противовоспалительных препаратов повышает риск кровотечения.

Инфекция: В редких случаях может потребоваться лечение антибиотиками, госпитализация или повторная операция.

Рубцы: Любая операция оставляет рубцы. Возможны гипертрофические или асимметричные рубцы, требующие коррекции.

Изменение чувствительности кожи: Возможна временная или постоянная потеря чувствительности.

Контурные неровности: Возможны неровности кожи, «излишки» ткани по краям разрезов.

Изменение цвета кожи и отёки: Синяки и отёки — нормальное явление, но иногда могут сохраняться длительно.

Повреждение глубоких структур: Возможны повреждения нервов, сосудов, мышц или лёгких (пневмоторакс).

Серома: Возможное скопление жидкости, требующее дренирования.

Анестезия: Любая анестезия связана с риском осложнений, включая летальный исход.

Боль: После операции возможна боль различной интенсивности и продолжительности.

Сердечно-сосудистые осложнения: Возможны осложнения со стороны сердца и лёгких, особенно при наличии факторов риска.

Аллергические реакции: Возможны местные или системные аллергические реакции, включая анафилаксию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Курение и никотин: Увеличивают риск осложнений и нарушают заживление.

Лекарства и добавки: Некоторые препараты повышают риск кровотечения. Не прекращайте приём назначенных препаратов без консультации врача.

Воздействие солнца: Может ухудшать заживление и усиливать пигментацию рубцов.

Планы поездок: Возможные осложнения могут задержать возвращение к обычной жизни.

Беременность и грудное вскармливание: Операция обычно не препятствует беременности, но может повлиять на форму груди и грудное вскармливание.

Психическое здоровье: Важно иметь реалистичные ожидания. Результаты операции не гарантируют психологического эффекта.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В некоторых случаях может потребоваться дополнительная операция для достижения желаемого результата или устранения осложнений. Медицина не является точной наукой, и гарантии результата не предоставляются.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПАЦИЕНТОМ

Строго следуйте указаниям врача. Ограничьте физическую активность. Посещайте контрольные осмотры.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Документ информированного согласия предназначен для предоставления информации о процедуре, её рисках и альтернативах, включая отказ от операции. Он не может охватить все возможные методы лечения и риски. Стандарты медицинской помощи могут меняться по мере развития науки.

Пожалуйста, внимательно прочитайте вышеуказанную информацию и убедитесь, что получили ответы на все ваши вопросы.